

## Vodič za imunizaciju PALIVIZUMABOM

1. Nedonoščad <29 gestacionih nedjelja, dob <12 mjeseci na početku RSV sezone
2. Nedonoščad 29-32 NG, dob <6 mjeseci na početku sezone
3. Nedonoščad 33-35 NG, dob <3mj na početku sezone
4. Djeca sa hemodinamski signifikantnim urođenim srčanim manama sa ili bez cijanoze, u dobi <12mjeseci u vrijeme izbijanja RSV infekcije a prema procjeni kardiologa tokom druge godine
5. Djeca sa BPD tokom prve godine, a tokom druge godine ako su u zadnjih 6 mjeseci na terapiji (kortikosteroidi, O2, bronhodilatatori)
6. Imunodeficijencije tokom prve dvije godine života
7. Imunosupresivna terapija tokom prve dvije godine života
8. Neuromuskularna oboljenja tokom prve dvije godine života
9. Transplantacija organa i transplantacija hematopoetičnih ćelija, tokom prve dvije godine života
10. Cistična fibroza, tokom prve dvije godine života
11. Ostalo (dijafragmalna hernija post op, hipoplazija pluća ili redukcija plućne funkcije druge etiologije, Down sy i druga rijetka stanja kod kojih RSV infekcijamože biti životno ugrožavajuća) u dobi < 1godine,tokom druge godine života po procjeni ordinirajućeg ljekara.

Udruženja pedijatarata u Bosni i Hercegovini

